

## 9. 主要部位別の資料（平成25年）

### （1）受診の動機

（H25年）

部位	国際分類	観察数	自覚症状	検診	その他
全部位	C00～C96, D00～D09	8,426 (100%)	24.3%	18.7%	57.0%
食道	C15	197 (100%)	29.9	16.2	53.8
胃	C16	1,483 (100%)	23.2	28.1	48.7
結腸	C18	855 (100%)	32.7	17.8	49.5
直腸	C19～C21	442 (100%)	34.2	19.9	45.9
肝臓	C22	306 (100%)	16.3	2.0	81.7
胆嚢・胆管	C23～C24	216 (100%)	27.3	5.1	67.6
膵臓	C25	320 (100%)	31.3	3.4	65.3
肺	C33～C34	854 (100%)	15.5	17.9	66.6
皮膚	C43～C44, C46	153 (100%)	33.3	0.7	66.0
乳房	C50, D05	744 (100%)	32.8	25.4	41.8
子宮	C53～58, D06	310 (100%)	15.5	37.1	47.4
卵巣	C56～C57	69 (100%)	31.9	5.8	62.3
前立腺	C61	511 (100%)	18.6	24.3	57.1
膀胱	C67	188 (100%)	41.0	2.1	56.9
腎臓・尿管	C64～C68	214 (100%)	14.0	11.2	74.8
脳	C71	47 (100%)	27.7	6.4	66.0
甲状腺	C73	189 (100%)	13.8	19.0	67.2
リンパ組織	C81～C90, C96	241 (100%)	24.9	6.6	68.5
白血病	C91～C95	44 (100%)	6.8	6.8	86.4

### （2）病巣の広がり

（H25年）

部位	国際分類	観察数	早期 （上皮内）	当該臓器 限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔 転移	不明
全部位	C00～C96, D00～D09	8,426 (100%)	11.3%	43.9%	9.1%	10.2%	15.8%	9.7%
食道	C15	197 (100%)	6.6	31.0	9.1	15.7	17.8	19.8
胃	C16	1,483 (100%)	4.1	58.9	10.1	5.9	16.2	4.7
結腸	C18	855 (100%)	1.9	44.9	19.6	10.1	18.9	4.6
直腸	C19～C21	442 (100%)	2.7	47.3	18.1	6.8	17.6	7.5
肝臓	C22	306 (100%)	0.0	58.8	1.3	9.8	10.8	19.3
胆嚢・胆管	C23～C24	216 (100%)	0.5	24.5	5.1	37.0	16.2	16.7
膵臓	C25	320 (100%)	0.3	7.8	4.1	29.4	45.0	13.4
肺	C33～C34	854 (100%)	0.0	34.9	9.5	9.7	36.1	9.8
皮膚	C43～C44, C46	153 (100%)	1.3	86.9	2.6	5.9	0.0	3.3
乳房	C50, D05	744 (100%)	12.4	53.1	16.0	3.2	4.0	11.3
子宮	C53～58, D06	310 (100%)	54.5	28.4	1.6	8.1	3.5	3.9
卵巣	C56～C57	69 (100%)	0.0	23.2	4.3	40.6	14.5	17.4
前立腺	C61	511 (100%)	0.2	63.6	1.2	10.8	11.2	13.1
膀胱	C67	188 (100%)	5.3	70.7	1.6	8.5	4.3	9.6
腎臓・尿管	C64～C68	214 (100%)	0.5	67.8	1.9	11.2	11.2	7.5
脳	C71	47 (100%)	0.0	68.1	0.0	10.6	4.3	17.0
甲状腺	C73	189 (100%)	0.0	48.1	33.3	7.9	5.8	4.8

### (3) 診断方法

部位別の罹患件数に対する割合 (%)

(H25年)

部位	国際分類	画像診断	病理診断			その他	
			細胞診	組織診	剖検		
全部位	C00～C96, D00～D09	75.4	66.2	22.1	58.6	0.0	47.5
食道	C15	86.4	78.0	3.7	77.6	0.0	64.0
胃	C16	80.6	84.3	4.9	83.8	0.0	53.8
結腸	C18	73.7	71.2	4.0	70.8	0.0	51.4
直腸	C19～C21	79.0	71.5	4.8	71.3	0.0	59.3
肝臓	C22	70.7	10.4	4.1	7.8	0.0	56.7
胆嚢・胆管	C23～C24	67.5	34.9	21.5	26.0	0.0	46.0
膵臓	C25	75.1	41.1	30.4	27.7	0.0	58.9
肺	C33～C34	75.2	58.2	50.9	46.2	0.2	60.7
乳房(女性)	C50, D05	88.3	83.6	22.3	76.3	0.0	59.6
乳房(男性)	C50, D05	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0	75.0
子宮頸部	C53	91.9	90.3	82.3	87.1	0.0	59.7
子宮体部	C54	84.3	83.1	74.2	71.9	0.0	69.7
卵巣	C56～C57	82.5	68.8	65.0	28.8	0.0	71.3
前立腺	C61	81.9	76.9	3.2	75.6	0.0	64.6
膀胱	C67	74.7	69.4	59.8	36.7	0.0	17.5
腎臓・尿管	C64～C66, C68	78.7	39.8	32.0	13.5	0.0	16.0
脳	C71	80.0	18.3	5.0	16.7	0.0	15.0
甲状腺	C73	85.3	81.7	72.6	24.4	0.0	18.8

### (4) 治療方法

部位別の罹患件数に対する割合 (%)

(H25年)

部位	国際分類	手術	放射線	化学療法	その他
全部位	C00～C96, D00～D09	62.8	11.1	30.2	19.7
食道	C15	46.7	31.5	46.7	18.8
胃	C16	76.8	0.4	18.7	14.0
結腸	C18	85.6	0.4	28.9	10.5
直腸	C19～C21	83.9	4.1	38.2	11.1
肝	C22	24.2	1.6	35.6	43.1
胆嚢・胆管	C23～C24	57.4	4.6	32.4	25.5
膵	C25	33.3	4.4	54.8	29.0
肺	C33～C34	37.9	15.9	41.8	26.8
乳房(女性)	C50, D05	88.3	41.9	44.6	12.0
乳房(男性)	C50, D05	100.0	25.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	65.0	35.0	31.7	20.0
子宮体部	C54	90.6	1.2	30.6	10.6
卵巣	C56～C57	79.7	0.0	69.6	7.2
前立腺	C61	19.6	30.0	16.1	43.6
膀胱	C67	83.6	12.2	25.4	7.4
腎・尿管	C64～C66, C68	71.0	2.3	9.3	21.5
脳	C71	44.9	36.7	32.7	44.9
甲状腺	C73	83.7	6.3	2.1	17.4

### (5) 年齢階級別罹患数

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H25年）

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)	
	C00～C96		口腔							咽頭	
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11	
総数	5,463	96	1	18	5	14	3	10	11	9	
0～4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5～9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10～14	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
15～19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20～24	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25～29	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30～34	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35～39	41	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
40～44	60	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
45～49	55	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
50～54	129	6	1	1	1	0	0	2	0	1	
55～59	317	7	0	1	1	1	0	1	2	1	
60～64	664	17	0	4	1	1	1	1	2	4	
65～69	849	12	0	1	1	3	0	1	1	1	
70～74	924	20	0	5	0	3	1	1	1	1	
75～79	902	12	0	3	1	2	0	1	2	1	
80～84	842	12	0	1	0	3	0	2	1	0	
85～	635	5	0	0	0	0	1	0	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H25年）

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)	
	C00～C96		口腔							咽頭	
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11	
総数	4,194	73	1	23	7	21	1	13	2	0	
0～4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5～9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10～14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15～19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20～24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25～29	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30～34	61	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
35～39	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40～44	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45～49	176	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
50～54	220	2	0	1	0	1	0	0	0	0	
55～59	243	6	0	4	0	0	0	1	1	0	
60～64	406	3	0	0	0	1	0	1	0	0	
65～69	453	8	0	1	0	1	1	4	0	0	
70～74	482	12	1	5	1	1	0	3	0	0	
75～79	520	5	0	1	1	2	0	1	0	0	
80～84	576	16	0	6	1	8	0	1	0	0	
85～	735	19	0	4	3	7	0	2	1	0	
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H25年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	C12～C13	口腔	C15	C16	C17	C18	肛門	肝内胆管	肝外胆管	C25
		C14					C19～C21	C22	C23～C24	
総数	17	8	183	1,108	29	493	311	252	152	190
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
30～34	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0
35～39	0	0	0	5	0	1	1	1	0	0
40～44	0	0	1	8	0	6	6	4	0	1
45～49	0	0	1	7	0	5	8	4	0	2
50～54	0	0	2	25	2	12	11	6	2	5
55～59	0	0	7	59	2	31	32	13	5	11
60～64	2	1	28	137	6	58	43	37	9	26
65～69	3	1	35	187	8	75	45	39	22	19
70～74	8	0	37	207	6	74	49	44	18	33
75～79	2	0	32	184	3	79	54	37	22	31
80～84	2	3	22	165	1	80	37	38	29	35
85～	0	3	18	121	1	70	24	29	43	27
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H25年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	C12～C13	口腔	C15	C16	C17	C18	肛門	肝内胆管	肝外胆管	C25
		C14					C19～C21	C22	C23～C24	
総数	5	0	31	489	12	462	170	134	137	192
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30～34	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0
35～39	0	0	0	4	1	2	0	1	0	0
40～44	0	0	0	7	0	4	3	0	0	0
45～49	0	0	0	9	0	7	4	1	0	3
50～54	0	0	1	9	0	16	3	5	3	2
55～59	0	0	2	14	1	19	12	2	3	1
60～64	1	0	4	43	1	41	23	11	4	11
65～69	1	0	6	56	3	54	32	12	12	25
70～74	1	0	2	73	1	56	25	12	19	28
75～79	0	0	4	85	1	74	20	33	18	33
80～84	0	0	7	86	2	87	19	21	26	32
85～	2	0	5	102	2	100	28	35	52	57
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H25年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30~C31	C32	C33~C34	C45	C37~C38	C39	C40~C41	C47, C49
総数	8	1	18	48	696	9	16	0	7	16
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25~29	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
30~34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
35~39	0	0	0	1	4	0	0	0	1	0
40~44	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0
45~49	0	0	0	0	7	0	2	0	0	0
50~54	0	0	0	2	10	0	0	0	0	0
55~59	1	0	2	3	33	0	0	0	0	1
60~64	1	1	4	5	80	1	3	0	2	1
65~69	4	0	1	12	90	3	0	0	0	5
70~74	1	0	2	8	104	0	1	0	0	2
75~79	0	0	4	6	123	2	3	0	2	2
80~84	1	0	3	6	131	2	3	0	1	3
85~	0	0	0	5	110	1	2	0	0	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H25年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30~C31	C32	C33~C34	C45	C37~C38	C39	C40~C41	C47, C49
総数	10	0	8	8	326	4	7	0	5	10
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
25~29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30~34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35~39	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
40~44	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45~49	0	0	0	0	5	0	1	0	0	1
50~54	1	0	0	1	7	0	0	0	0	0
55~59	1	0	1	0	16	0	0	0	0	0
60~64	1	0	0	1	30	0	0	0	0	0
65~69	2	0	1	0	33	1	1	0	0	1
70~74	0	0	2	1	39	0	1	0	1	3
75~79	0	0	0	3	41	0	1	0	1	0
80~84	1	0	0	2	61	2	0	0	0	3
85~	2	0	3	0	93	1	2	0	1	1
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H25年）

年齢	悪性	その他	乳房	前立腺	睾丸	陰茎
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)			その他男性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C61	C62	C60, C63
総数	8	65	6	554	19	7
0～4	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	2	0
25～29	0	0	0	0	1	0
30～34	1	1	0	0	3	0
35～39	0	1	0	0	5	0
40～44	0	0	0	1	5	0
45～49	0	0	1	0	1	0
50～54	1	4	0	4	1	0
55～59	2	2	0	20	0	1
60～64	1	5	2	52	0	1
65～69	0	7	0	121	0	0
70～74	2	7	0	107	1	1
75～79	0	14	2	108	0	1
80～84	1	16	1	89	0	1
85～	0	8	0	52	0	2
不詳	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H25年）

年齢	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)	部位不明						その他女性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C53～55, C58	C55	C53	C58	C54	C56～C57	C51, C52
総数	11	77	790	156	5	62	0	89	80	7
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
20～24	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	1	2	0	2	0	0	1	0
30～34	0	0	14	7	0	6	0	1	1	0
35～39	0	0	37	12	0	9	0	3	1	0
40～44	0	0	74	4	0	1	0	3	3	0
45～49	0	1	85	10	0	5	0	5	4	1
50～54	0	1	86	22	0	4	0	18	12	0
55～59	0	2	70	27	0	7	0	20	6	0
60～64	0	12	103	20	1	6	0	13	12	1
65～69	2	4	96	13	0	4	0	9	5	2
70～74	3	7	75	9	2	3	0	4	10	0
75～79	1	11	65	6	0	2	0	4	6	0
80～84	0	16	44	14	1	7	0	6	10	1
85～	5	22	39	10	1	6	0	3	8	2
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H25年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・ 付属器	脳	髄膜・ その他神経系	甲状腺	副腎・ その他内分泌腺	その他 部位不明確	リンパ <sup>o</sup> 節 続発性	呼吸消化器 続発性
	C67	C64~66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74~C75	C76	C77	C78
	総数	175	167	3	34	26	59	12	3	3
0~4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
25~29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
30~34	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0
35~39	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0
40~44	3	3	0	3	3	3	0	0	0	0
45~49	1	5	0	1	0	3	0	0	0	0
50~54	1	12	0	0	1	3	1	0	0	0
55~59	8	10	0	3	3	9	1	0	1	0
60~64	17	15	0	2	3	7	2	0	0	0
65~69	26	22	0	2	1	5	4	1	0	0
70~74	30	31	1	7	3	7	2	0	0	2
75~79	28	27	0	5	5	13	1	0	0	1
80~84	29	23	1	3	2	2	0	2	2	2
85~	32	17	0	1	2	3	0	0	0	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H25年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・ 付属器	脳	髄膜・ その他神経系	甲状腺	副腎・ その他内分泌腺	その他 部位不明確	リンパ <sup>o</sup> 節 続発性	呼吸消化器 続発性
	C67	C64~66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74~C75	C76	C77	C78
	総数	54	79	0	26	41	137	15	6	2
0~4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5~9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
20~24	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
25~29	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
30~34	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0
35~39	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0
40~44	0	2	0	0	2	11	1	0	0	0
45~49	0	2	0	0	1	16	0	1	0	0
50~54	0	4	0	1	2	15	3	0	0	0
55~59	1	4	0	2	4	9	1	0	0	0
60~64	2	6	0	5	5	17	1	0	0	0
65~69	1	8	0	5	5	11	1	0	0	0
70~74	4	8	0	1	8	13	2	0	0	0
75~79	6	13	0	3	4	7	1	2	0	0
80~84	21	20	0	0	4	7	1	1	0	0
85~	19	12	0	5	2	13	1	2	2	7
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H25年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
総数	5	36	208	133	5	40	30	66	13	43
0~4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
20~24	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
25~29	0	0	2	1	0	1	0	3	0	2
30~34	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
35~39	0	1	7	5	0	1	1	2	1	1
40~44	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0
45~49	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50~54	0	0	4	2	0	2	0	0	0	0
55~59	0	0	16	9	2	5	0	5	2	2
60~64	0	5	24	15	1	5	3	9	3	5
65~69	0	7	21	14	1	3	3	9	2	5
70~74	0	4	27	15	0	5	7	8	0	6
75~79	2	7	33	23	0	6	4	11	0	10
80~84	2	5	45	32	0	7	6	8	1	6
85~	1	6	24	15	0	4	5	6	0	5
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H25年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
総数	6	23	183	117	2	30	34	43	6	35
0~4	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
5~9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15~19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20~24	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
25~29	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1
30~34	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
35~39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~44	0	1	2	2	0	0	0	1	0	1
45~49	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
50~54	0	0	9	6	0	1	2	0	0	0
55~59	0	2	13	6	0	7	0	6	2	4
60~64	0	1	16	7	0	5	4	7	1	6
65~69	0	2	17	12	0	1	4	2	0	2
70~74	2	1	26	16	1	7	2	5	0	5
75~79	0	4	28	16	0	4	8	6	2	4
80~84	1	3	25	18	0	3	4	7	0	6
85~	3	9	41	31	0	0	10	5	0	5
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 主要部位の年齢階級別罹患数・男（H25年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D09
総数	0	4	6	227	7	27	104
0～4	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	0
25～29	0	0	1	0	0	0	0
30～34	0	0	0	0	0	0	0
35～39	0	0	0	2	1	0	1
40～44	0	0	0	3	0	0	0
45～49	0	0	0	4	0	0	0
50～54	0	0	0	10	0	0	4
55～59	0	0	1	19	0	4	6
60～64	0	0	1	46	1	1	12
65～69	0	2	0	43	2	2	19
70～74	0	1	1	53	1	4	20
75～79	0	1	0	23	0	8	17
80～84	0	0	1	18	2	4	15
85～	0	0	1	6	0	4	10
不詳	0	0	0	0	0	0	0

表 主要部位の年齢階級別罹患数・女（H25年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D06	D09
総数	0	1	1	145	5	30	169	24
0～4	0	0	0	0	0	0	0	0
5～9	0	0	0	0	0	0	0	0
10～14	0	0	0	0	0	0	0	0
15～19	0	0	0	0	0	0	0	0
20～24	0	0	0	0	0	0	4	0
25～29	0	0	1	0	0	0	20	0
30～34	0	0	0	0	0	0	26	0
35～39	0	0	0	1	0	0	36	0
40～44	0	0	0	2	0	0	41	0
45～49	0	0	0	3	0	0	17	1
50～54	0	0	0	6	1	1	6	1
55～59	0	0	0	11	1	0	6	0
60～64	0	0	0	17	0	1	6	1
65～69	0	0	0	22	1	3	3	3
70～74	0	0	0	25	0	3	3	2
75～79	0	0	0	25	2	4	0	7
80～84	0	1	0	25	0	6	0	5
85～	0	0	0	8	0	12	1	4
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 性・年齢階級別罹患率

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男 (H25年)

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	C00～C96						口腔		咽頭	
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
0～4	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	15.6	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0
15～19	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	107.4	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	147.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
45～49	169.1	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	416.1	19.4	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	6.5	0.0	3.2
55～59	988.8	21.8	0.0	3.1	3.1	3.1	0.0	3.1	6.2	3.1
60～64	1579.9	40.5	0.0	9.5	2.4	2.4	2.4	2.4	4.8	9.5
65～69	2103.2	29.7	0.0	2.5	2.5	7.4	0.0	2.5	2.5	2.5
70～74	2928.7	63.4	0.0	15.8	0.0	9.5	3.2	3.2	3.2	3.2
75～79	3700.5	49.2	0.0	12.3	4.1	8.2	0.0	4.1	8.2	4.1
80～84	4546.7	64.8	0.0	5.4	0.0	16.2	0.0	10.8	5.4	0.0
85～	4527.6	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0
粗罹患率	1059.6	18.5	0.2	3.5	1.0	2.7	0.6	1.9	2.1	1.7
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	519.5	10.3	0.2	2.1	0.7	1.4	0.2	1.4	1.2	1.1
世界人口	366.6	7.6	0.2	1.6	0.5	1.0	0.2	1.1	0.9	0.8

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女 (H25年)

年齢	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻(上)
	C00～C96						口腔		咽頭	
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
0～4	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	143.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	221.9	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	301.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	414.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	539.0	3.1	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	697.2	6.3	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
55～59	724.7	17.9	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
60～64	916.8	6.8	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.0
65～69	1046.6	18.5	0.0	2.3	0.0	2.3	2.3	9.2	0.0	0.0
70～74	1309.1	32.6	2.7	13.6	2.7	2.7	0.0	8.1	0.0	0.0
75～79	1565.6	15.1	0.0	3.0	3.0	6.0	0.0	3.0	0.0	0.0
80～84	1912.3	53.1	0.0	19.9	3.3	26.6	0.0	3.3	0.0	0.0
85～	2081.7	53.8	0.0	11.3	8.5	19.8	0.0	5.7	2.8	0.0
粗罹患率	752.8	13.1	0.2	4.1	1.3	3.8	0.2	2.3	0.4	0.0
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	399.9	5.1	0.1	2.0	0.5	1.0	0.1	1.0	0.2	0.0
世界人口	302.6	3.6	0.1	1.4	0.3	0.7	0.1	0.7	0.1	0.0

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H25年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	口腔						肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	8.1	0.0
30~34	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0
35~39	0.0	0.0	0.0	13.1	0.0	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0
40~44	0.0	0.0	2.5	19.7	0.0	14.8	14.8	9.8	0.0	2.5
45~49	0.0	0.0	3.1	21.5	0.0	15.4	24.6	12.3	0.0	6.1
50~54	0.0	0.0	6.5	80.6	6.5	38.7	35.5	19.4	6.5	16.1
55~59	0.0	0.0	21.8	184.0	6.2	96.7	99.8	40.6	15.6	34.3
60~64	4.8	2.4	66.6	326.0	14.3	138.0	102.3	88.0	21.4	61.9
65~69	7.4	2.5	86.7	463.2	19.8	185.8	111.5	96.6	54.5	47.1
70~74	25.4	0.0	117.3	656.1	19.0	234.5	155.3	139.5	57.1	104.6
75~79	8.2	0.0	131.3	754.9	12.3	324.1	221.5	151.8	90.3	127.2
80~84	10.8	16.2	118.8	891.0	5.4	432.0	199.8	205.2	156.6	189.0
85~	0.0	21.4	128.3	862.7	7.1	499.1	171.1	206.8	306.6	192.5
粗罹患率	3.3	1.5	35.3	213.5	5.6	95.0	59.9	48.6	29.3	36.6
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	1.5	0.5	16.6	102.8	3.1	45.7	32.5	23.8	12.2	17.2
世界人口	1.1	0.4	11.7	71.8	2.3	31.9	23.2	16.9	8.4	11.9

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H25年）

年齢	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	口腔						肛門	肝内胆管	肝外胆管	
	C12~C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19~C21	C22	C23~C24	C25
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0
30~34	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	7.3	3.6	0.0	0.0	0.0
35~39	0.0	0.0	0.0	11.2	2.8	5.6	0.0	2.8	0.0	0.0
40~44	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	10.4	7.8	0.0	0.0	0.0
45~49	0.0	0.0	0.0	27.6	0.0	21.4	12.3	3.1	0.0	9.2
50~54	0.0	0.0	3.2	28.5	0.0	50.7	9.5	15.8	9.5	6.3
55~59	0.0	0.0	6.0	41.8	3.0	56.7	35.8	6.0	8.9	3.0
60~64	2.3	0.0	9.0	97.1	2.3	92.6	51.9	24.8	9.0	24.8
65~69	2.3	0.0	13.9	129.4	6.9	124.8	73.9	27.7	27.7	57.8
70~74	2.7	0.0	5.4	198.3	2.7	152.1	67.9	32.6	51.6	76.0
75~79	0.0	0.0	12.0	255.9	3.0	222.8	60.2	99.4	54.2	99.4
80~84	0.0	0.0	23.2	285.5	6.6	288.8	63.1	69.7	86.3	106.2
85~	5.7	0.0	14.2	288.9	5.7	283.2	79.3	99.1	147.3	161.4
粗罹患率	0.9	0.0	5.6	87.8	2.2	82.9	30.5	24.1	24.6	34.5
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.3	0.0	2.2	34.1	1.0	32.7	13.9	8.7	7.1	11.0
世界人口	0.2	0.0	1.6	23.9	0.7	23.1	10.3	6.0	4.8	7.6

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H25年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4
35～39	0.0	0.0	0.0	2.6	10.5	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0
40～44	0.0	0.0	4.9	0.0	7.4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	0.0	21.5	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0	6.5	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55～59	3.1	0.0	6.2	9.4	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
60～64	2.4	2.4	9.5	11.9	190.4	2.4	7.1	0.0	4.8	2.4
65～69	9.9	0.0	2.5	29.7	222.9	7.4	0.0	0.0	0.0	12.4
70～74	3.2	0.0	6.3	25.4	329.6	0.0	3.2	0.0	0.0	6.3
75～79	0.0	0.0	16.4	24.6	504.6	8.2	12.3	0.0	8.2	8.2
80～84	5.4	0.0	16.2	32.4	707.4	10.8	16.2	0.0	5.4	16.2
85～	0.0	0.0	0.0	35.7	784.3	7.1	14.3	0.0	0.0	7.1
粗罹患率	1.5	0.2	3.5	9.2	134.1	1.7	3.1	0.0	1.3	3.1
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.8	0.1	2.0	4.6	61.2	0.7	1.9	0.0	0.9	1.6
世界人口	0.6	0.1	1.4	3.3	41.8	0.5	1.5	0.0	0.7	1.1

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H25年）

年齢	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0	2.8
40～44	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	3.1	0.0	0.0	3.1
50～54	3.2	0.0	0.0	3.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55～59	3.0	0.0	3.0	0.0	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60～64	2.3	0.0	0.0	2.3	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65～69	4.6	0.0	2.3	0.0	76.2	2.3	2.3	0.0	0.0	2.3
70～74	0.0	0.0	5.4	2.7	105.9	0.0	2.7	0.0	2.7	8.1
75～79	0.0	0.0	0.0	9.0	123.4	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
80～84	3.3	0.0	0.0	6.6	202.5	6.6	0.0	0.0	0.0	10.0
85～	5.7	0.0	8.5	0.0	263.4	2.8	5.7	0.0	2.8	2.8
粗罹患率	1.8	0.0	1.4	1.4	58.5	0.7	1.3	0.0	0.9	1.8
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	1.1	0.0	0.8	0.6	21.0	0.2	0.7	0.0	0.8	0.9
世界人口	0.9	0.0	0.7	0.4	14.8	0.1	0.5	0.0	0.9	0.6

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H25年）

年齢	悪性	その他	乳房	前立腺	睾丸	陰茎
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)			その他男性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C61	C62	C60, C63
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0
30～34	3.4	3.4	0.0	0.0	10.2	0.0
35～39	0.0	2.6	0.0	0.0	13.1	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	2.5	12.3	0.0
45～49	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0
50～54	3.2	12.9	0.0	12.9	3.2	0.0
55～59	6.2	6.2	0.0	62.4	0.0	3.1
60～64	2.4	11.9	4.8	123.7	0.0	2.4
65～69	0.0	17.3	0.0	299.7	0.0	0.0
70～74	6.3	22.2	0.0	339.1	3.2	3.2
75～79	0.0	57.4	8.2	443.1	0.0	4.1
80～84	5.4	86.4	5.4	480.6	0.0	5.4
85～	0.0	57.0	0.0	370.8	0.0	14.3
粗罹患率	1.5	12.5	1.2	106.7	3.7	1.3
年齢調整罹患率						
S60年モデル人口	1.2	6.0	0.7	48.2	4.2	0.6
世界人口	0.9	4.0	0.5	32.7	3.6	0.4

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H25年）

年齢	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫	皮膚	(上皮内含む)		部位不明					その他女性性器
	C43	C44, C46	C50, D05	C53～55, C58	C55	C53	C58	C54	C56～C57	C51, C52
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
20～24	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	4.4	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	4.4	0.0
30～34	0.0	0.0	50.9	25.5	0.0	21.8	0.0	3.6	3.6	0.0
35～39	0.0	0.0	103.2	33.5	0.0	25.1	0.0	8.4	2.8	0.0
40～44	0.0	0.0	191.7	10.4	0.0	2.6	0.0	7.8	7.8	0.0
45～49	0.0	3.1	260.3	30.6	0.0	15.3	0.0	15.3	12.3	3.1
50～54	0.0	3.2	272.6	69.7	0.0	12.7	0.0	57.0	38.0	0.0
55～59	0.0	6.0	208.8	80.5	0.0	20.9	0.0	59.6	17.9	0.0
60～64	0.0	27.1	232.6	45.2	2.3	13.5	0.0	29.4	27.1	2.3
65～69	4.6	9.2	221.8	30.0	0.0	9.2	0.0	20.8	11.6	4.6
70～74	8.1	19.0	203.7	24.4	5.4	8.1	0.0	10.9	27.2	0.0
75～79	3.0	33.1	195.7	18.1	0.0	6.0	0.0	12.0	18.1	0.0
80～84	0.0	53.1	146.1	46.5	3.3	23.2	0.0	19.9	33.2	3.3
85～	14.2	62.3	110.5	28.3	2.8	17.0	0.0	8.5	22.7	5.7
粗罹患率	2.0	13.8	141.8	28.0	0.9	11.1	0.0	16.0	14.4	1.3
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.6	5.0	106.2	22.0	0.3	9.2	0.0	12.5	9.4	0.6
世界人口	0.4	3.6	82.4	17.2	0.2	7.3	0.0	9.6	7.3	0.5

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H25年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
	付属器			その他神経系		その他内分泌腺		部位不明確		統発性
	C67	C64～66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
0～4	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	6.8	3.4	6.8	3.4	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	5.2	0.0	2.6	5.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	7.4	7.4	0.0	7.4	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
45～49	3.1	15.4	0.0	3.1	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
50～54	3.2	38.7	0.0	0.0	3.2	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0
55～59	25.0	31.2	0.0	9.4	9.4	28.1	3.1	0.0	3.1	0.0
60～64	40.5	35.7	0.0	4.8	7.1	16.7	4.8	0.0	0.0	0.0
65～69	64.4	54.5	0.0	5.0	2.5	12.4	9.9	2.5	0.0	0.0
70～74	95.1	98.3	3.2	22.2	9.5	22.2	6.3	0.0	0.0	6.3
75～79	114.9	110.8	0.0	20.5	20.5	53.3	4.1	0.0	0.0	4.1
80～84	156.6	124.2	5.4	16.2	10.8	10.8	0.0	10.8	10.8	10.8
85～	228.2	121.2	0.0	7.1	14.3	21.4	0.0	0.0	0.0	28.5
粗罹患率	33.7	32.2	0.6	6.6	5.0	11.4	2.3	0.6	0.6	1.7
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	15.0	17.3	0.5	4.9	3.3	7.7	1.5	0.2	0.3	0.6
世界人口	10.3	12.2	0.7	4.1	2.4	5.7	1.1	0.1	0.2	0.4

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H25年）

年齢	膀胱	腎・尿管	眼・	脳	髄膜・	甲状腺	副腎・	その他	リンパ節	呼吸消化器
	付属器			その他神経系		その他内分泌腺		部位不明確		統発性
	C67	C64～66, C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74～C75	C76	C77	C78
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	14.5	3.6	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0
40～44	0.0	5.2	0.0	0.0	5.2	28.5	2.6	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	6.1	0.0	0.0	3.1	49.0	0.0	3.1	0.0	0.0
50～54	0.0	12.7	0.0	3.2	6.3	47.5	9.5	0.0	0.0	0.0
55～59	3.0	11.9	0.0	6.0	11.9	26.8	3.0	0.0	0.0	0.0
60～64	4.5	13.5	0.0	11.3	11.3	38.4	2.3	0.0	0.0	0.0
65～69	2.3	18.5	0.0	11.6	11.6	25.4	2.3	0.0	0.0	0.0
70～74	10.9	21.7	0.0	2.7	21.7	35.3	5.4	0.0	0.0	0.0
75～79	18.1	39.1	0.0	9.0	12.0	21.1	3.0	6.0	0.0	0.0
80～84	69.7	66.4	0.0	0.0	13.3	23.2	3.3	3.3	0.0	0.0
85～	53.8	34.0	0.0	14.2	5.7	36.8	2.8	5.7	5.7	19.8
粗罹患率	9.7	14.2	0.0	4.7	7.4	24.6	2.7	1.1	0.4	1.3
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	2.3	6.0	0.0	3.1	4.7	19.7	2.3	0.4	0.0	0.1
世界人口	1.4	4.2	0.0	2.9	3.8	16.0	2.0	0.3	0.0	0.1

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H25年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
0~4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	0.0	3.9
20~24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0
25~29	0.0	0.0	8.1	4.1	0.0	4.1	0.0	12.2	0.0	8.1
30~34	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35~39	0.0	2.6	18.3	13.1	0.0	2.6	2.6	5.2	2.6	2.6
40~44	0.0	0.0	7.4	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
45~49	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50~54	0.0	0.0	12.9	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0
55~59	0.0	0.0	49.9	28.1	6.2	15.6	0.0	15.6	6.2	6.2
60~64	0.0	11.9	57.1	35.7	2.4	11.9	7.1	21.4	7.1	11.9
65~69	0.0	17.3	52.0	34.7	2.5	7.4	7.4	22.3	5.0	12.4
70~74	0.0	12.7	85.6	47.5	0.0	15.8	22.2	25.4	0.0	19.0
75~79	8.2	28.7	135.4	94.4	0.0	24.6	16.4	45.1	0.0	41.0
80~84	10.8	27.0	243.0	172.8	0.0	37.8	32.4	43.2	5.4	32.4
85~	7.1	42.8	171.1	107.0	0.0	28.5	35.7	42.8	0.0	35.7
粗罹患率	1.0	6.9	40.1	25.6	1.0	7.7	5.8	12.7	2.5	8.3
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.3	3.2	20.4	12.7	0.7	4.4	2.7	8.0	2.4	4.4
世界人口	0.2	2.2	14.4	8.7	0.6	3.2	2.0	6.9	2.6	3.4

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H25年）

年齢	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81~C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91~C95	C91	C92
0~4	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	5.1	0.0	5.1	5.1	0.0
5~9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10~14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15~19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20~24	0.0	0.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25~29	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	4.4	0.0	8.7	0.0	4.4
30~34	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6
35~39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40~44	0.0	2.6	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
45~49	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50~54	0.0	0.0	28.5	19.0	0.0	3.2	6.3	0.0	0.0	0.0
55~59	0.0	6.0	38.8	17.9	0.0	20.9	0.0	17.9	6.0	11.9
60~64	0.0	2.3	36.1	15.8	0.0	11.3	9.0	15.8	2.3	13.5
65~69	0.0	4.6	39.3	27.7	0.0	2.3	9.2	4.6	0.0	4.6
70~74	5.4	2.7	70.6	43.5	2.7	19.0	5.4	13.6	0.0	13.6
75~79	0.0	12.0	84.3	48.2	0.0	12.0	24.1	18.1	6.0	12.0
80~84	3.3	10.0	83.0	59.8	0.0	10.0	13.3	23.2	0.0	19.9
85~	8.5	25.5	116.1	87.8	0.0	0.0	28.3	14.2	0.0	14.2
粗罹患率	1.1	4.1	32.8	21.0	0.4	5.4	6.1	7.7	1.1	6.3
年齢調整罹患率										
S60年モデル人口	0.3	1.4	14.7	8.7	0.4	3.5	2.1	4.5	0.9	3.2
世界人口	0.2	1.0	11.1	6.3	0.3	3.0	1.5	3.8	1.0	2.4

表 主要部位の年齢階級別罹患率・男（H25年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D09
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25～29	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	5.2	2.6	0.0	2.6
40～44	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0
50～54	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	0.0	12.9
55～59	0.0	0.0	3.1	59.3	0.0	12.5	18.7
60～64	0.0	0.0	2.4	109.5	2.4	2.4	28.6
65～69	0.0	5.0	0.0	106.5	5.0	5.0	47.1
70～74	0.0	3.2	3.2	168.0	3.2	12.7	63.4
75～79	0.0	4.1	0.0	94.4	0.0	32.8	69.7
80～84	0.0	0.0	5.4	97.2	10.8	21.6	81.0
85～	0.0	0.0	7.1	42.8	0.0	28.5	71.3
粗罹患率	0.0	0.8	1.2	43.7	1.3	5.2	20.0
年齢調整罹患率							
S60年モデル人口	0.0	0.4	0.8	24.4	0.7	2.4	9.8
世界人口	0.0	0.3	0.7	18.1	0.5	1.6	6.8

表 主要部位の年齢階級別罹患率・女（H25年）

年齢	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D06	D09
0～4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5～9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10～14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15～19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20～24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	0.0
25～29	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	87.1	0.0
30～34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.6	0.0
35～39	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	100.4	0.0
40～44	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	106.2	0.0
45～49	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	52.1	3.1
50～54	0.0	0.0	0.0	19.0	3.2	3.2	19.0	3.2
55～59	0.0	0.0	0.0	32.8	3.0	0.0	17.9	0.0
60～64	0.0	0.0	0.0	38.4	0.0	2.3	13.5	2.3
65～69	0.0	0.0	0.0	50.8	2.3	6.9	6.9	6.9
70～74	0.0	0.0	0.0	67.9	0.0	8.1	8.1	5.4
75～79	0.0	0.0	0.0	75.3	6.0	12.0	0.0	21.1
80～84	0.0	3.3	0.0	83.0	0.0	19.9	0.0	16.6
85～	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	34.0	2.8	11.3
粗罹患率	0.0	0.2	0.2	26.0	0.9	5.4	30.3	4.3
年齢調整罹患率								
S60年モデル人口	0.0	0.0	0.3	12.6	0.6	1.5	38.3	1.6
世界人口	0.0	0.0	0.3	9.0	0.4	1.0	32.4	1.1



10. 市町村別資料（平成25年）

（1）市町村別登録状況

表 市町村別登録状況（平成25年）

市町村	罹患数	死亡数	I/M比	DCO	DCO%
総計	9,865	3,517	2.80	947	9.6
新川医療圏	1,122	441	2.54	112	10.0
黒部	357	129	2.77	17	4.8
入善	225	93	2.42	34	15.1
朝日	114	55	2.07	30	26.3
魚津	426	164	2.60	31	7.3
富山医療圏	4,594	1,580	2.91	457	9.9
滑川	268	103	2.60	45	16.8
舟橋	13	5	2.60	2	15.4
上市	212	85	2.49	19	9.0
立山	302	88	3.43	21	7.0
富山	3,799	1,299	2.92	370	9.7
高岡医療圏	2,943	1,030	2.86	222	7.5
射水	755	273	2.77	69	9.1
高岡	1,678	592	2.83	116	6.9
氷見	510	165	3.09	37	7.3
砺波医療圏	1,206	466	2.59	156	12.9
砺波	446	167	2.67	40	9.0
南砺	471	184	2.56	77	16.3
小矢部	289	115	2.51	39	13.5

注)

I：がん罹患数※

※市町村別罹患数については、届出時点でのがん患者の住所地をもとにして市町村ごとに集計を行った数値であり、同一人物に関する複数の医療機関からの届出で、届出時点での住所地である市町村が異なる場合は、重複して集計される（同一人物でも罹患数は複数件計上）。

なお、県集計値としての罹患数は、上述のような重複を除いた数値である。

M：がんによる死亡数

I/M比：がん罹患数とがん死亡数との比

DCO：死亡情報のみで登録されたがん患者数

DCO%：がん死亡情報で初めて把握されたがん患者の割合

## (2) 市町村別罹患数

表 市町村別罹患数・男（H25年）

市町村	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻（上）
	C00～C96							口腔		咽頭
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総計	5,581	98	1	19	5	14	3	10	11	9
新川医療圏	657	15	0	2	1	3	0	1	3	1
黒部	215	5	0	0	0	1	0	1	2	0
入善	134	4	0	1	0	1	0	0	1	0
朝日	52	2	0	0	0	1	0	0	0	1
魚津	256	4	0	1	1	0	0	0	0	0
富山医療圏	2,557	47	0	10	2	6	2	4	4	6
滑川	162	3	0	1	0	0	0	1	0	0
舟橋	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	124	1	0	0	0	0	0	0	0	0
立山	175	3	0	1	0	0	0	0	1	0
富山	2,090	40	0	8	2	6	2	3	3	6
高岡医療圏	1,659	29	1	7	2	4	1	3	4	1
射水	434	11	0	0	1	2	0	1	2	1
高岡	935	13	1	7	1	2	0	1	0	0
氷見	290	5	0	0	0	0	1	1	2	0
砺波医療圏	708	7	0	0	0	1	0	2	0	1
砺波	271	3	0	0	0	0	0	0	0	1
南砺	277	1	0	0	0	1	0	0	0	0
小矢部	160	3	0	0	0	0	0	2	0	0

表 市町村別罹患数・女（H25年）

市町村	全部位	口腔咽頭	口唇	舌	大唾液腺	歯肉	口腔底	その他	中咽頭	鼻（上）
	C00～C96							口腔		咽頭
	D00～D09	C00～C14	C00	C01～C02	C07～C08	C03	C04	C05～C06	C09～C10	C11
総計	4,284	75	1	24	7	22	1	13	2	0
新川医療圏	465	8	0	2	0	6	0	0	0	0
黒部	142	2	0	0	0	2	0	0	0	0
入善	91	1	0	0	0	1	0	0	0	0
朝日	62	3	0	1	0	2	0	0	0	0
魚津	170	2	0	1	0	1	0	0	0	0
富山医療圏	2,037	25	1	8	4	6	0	6	0	0
滑川	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
舟橋	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	88	1	0	0	0	1	0	0	0	0
立山	127	3	0	1	0	1	0	1	0	0
富山	1,709	21	1	7	4	4	0	5	0	0
高岡医療圏	1,284	35	0	12	3	9	1	6	2	0
射水	321	6	0	3	1	0	0	1	0	0
高岡	743	24	0	7	1	8	1	4	2	0
氷見	220	5	0	2	1	1	0	1	0	0
砺波医療圏	498	7	0	2	0	1	0	1	0	0
砺波	175	5	0	1	0	0	0	1	0	0
南砺	194	1	0	0	0	1	0	0	0	0
小矢部	129	1	0	1	0	0	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・男（H25年）

市町村	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	C12～C13	C14	C15	C16	C17	C18	肛門	肝内胆管	肝外胆管	
							C19～C21	C22	C23～C24	
総計	18	8	190	1,117	29	497	311	257	154	194
新川医療圏	3	1	18	130	1	53	33	33	20	22
黒部	1	0	3	40	0	17	12	11	8	8
入善	0	1	1	24	1	14	9	3	5	6
朝日	0	0	3	5	0	5	2	4	0	0
魚津	2	0	11	61	0	17	10	15	7	8
富山医療圏	9	4	83	514	19	240	158	103	73	94
滑川	1	0	3	35	0	19	9	5	2	6
舟橋	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
上市	0	1	5	26	2	13	10	7	5	4
立山	1	0	8	34	0	12	11	4	4	4
富山	7	3	67	417	17	196	127	87	62	80
高岡医療圏	3	3	63	341	8	148	85	80	37	57
射水	2	2	16	87	2	37	27	18	12	11
高岡	1	0	36	173	2	86	42	47	18	35
氷見	0	1	11	81	4	25	16	15	7	11
砺波医療圏	3	0	26	132	1	56	35	41	24	21
砺波	2	0	8	52	1	21	15	10	8	9
南砺	0	0	12	45	0	22	15	19	11	8
小矢部	1	0	6	35	0	13	5	12	5	4

表 市町村別罹患数・女（H25年）

市町村	下咽頭	部位不明	食道	胃	小腸	結腸	直腸・	肝・	胆嚢・	膵
	C12～C13	C14	C15	C16	C17	C18	肛門	肝内胆管	肝外胆管	
							C19～C21	C22	C23～C24	
総計	5	0	33	494	12	466	172	137	139	201
新川医療圏	0	0	1	68	0	47	16	12	27	18
黒部	0	0	0	18	0	21	4	2	6	3
入善	0	0	1	16	0	12	1	2	9	4
朝日	0	0	0	7	0	6	5	2	4	4
魚津	0	0	0	27	0	8	6	6	8	7
富山医療圏	0	0	17	212	7	213	84	61	57	97
滑川	0	0	0	8	0	12	3	6	7	6
舟橋	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
上市	0	0	2	12	0	8	3	1	4	7
立山	0	0	2	14	0	14	4	2	2	4
富山	0	0	13	177	7	178	74	52	44	78
高岡医療圏	2	0	10	154	5	151	56	47	33	54
射水	1	0	1	36	3	35	18	11	11	10
高岡	1	0	4	86	2	84	31	30	17	37
氷見	0	0	5	32	0	32	7	6	5	7
砺波医療圏	3	0	5	60	0	55	16	17	22	32
砺波	3	0	1	23	0	14	5	4	9	8
南砺	0	0	2	28	0	23	6	5	10	14
小矢部	0	0	2	9	0	18	5	8	3	10

表 市町村別罹患数・男（H25年）

市町村	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
総計	8	1	18	49	716	9	17	0	6	17
新川医療圏	3	0	3	2	88	0	4	0	1	4
黒部	1	0	1	1	23	0	2	0	1	2
入善	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
朝日	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0
魚津	2	0	2	0	31	0	2	0	0	2
富山医療圏	4	0	8	23	316	9	6	0	3	8
滑川	0	0	0	1	18	1	0	0	1	1
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	2	2	11	0	0	0	0	0
立山	0	0	3	1	26	1	1	0	1	0
富山	4	0	3	19	261	7	5	0	1	7
高岡医療圏	1	1	7	17	216	0	4	0	2	3
射水	0	0	4	3	61	0	0	0	1	0
高岡	1	1	2	11	133	0	4	0	1	2
氷見	0	0	1	3	22	0	0	0	0	1
砺波医療圏	0	0	0	7	96	0	3	0	0	2
砺波	0	0	0	2	38	0	2	0	0	0
南砺	0	0	0	4	37	0	1	0	0	1
小矢部	0	0	0	1	21	0	0	0	0	1

表 市町村別罹患数・女（H25年）

市町村	後腹膜・	部位不明	鼻腔・中耳	喉頭	気管支・	胸膜	胸腺・心	部位不明	骨・	結合組織
	腹膜	消化器	副鼻腔		肺		縦隔・胸膜	胸腔内臓器	関節軟骨	軟部組織
	C48	C26	C30～C31	C32	C33～C34	C45	C37～C38	C39	C40～C41	C47, C49
総計	10	0	8	8	332	4	1	0	5	10
新川医療圏	0	0	2	1	37	0	0	0	0	2
黒部	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
入善	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
朝日	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
魚津	0	0	1	1	12	0	0	0	0	2
富山医療圏	3	0	2	4	163	3	0	0	4	7
滑川	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1
立山	0	0	0	0	14	1	0	0	0	1
富山	3	0	2	4	135	2	0	0	4	4
高岡医療圏	7	0	3	2	90	0	1	0	1	1
射水	2	0	2	0	19	0	0	0	1	1
高岡	3	0	1	1	51	0	1	0	0	0
氷見	2	0	0	1	20	0	0	0	0	0
砺波医療圏	0	0	1	1	42	1	0	0	0	0
砺波	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0
南砺	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0
小矢部	0	0	1	0	15	0	0	0	0	0

表 市町村別罹患数・男（H25年）

市町村	悪性	その他	乳房	前立腺	睾丸	陰茎
	黒色腫 C43	皮膚 C44, C46	(上皮内含む) C50, D05	C61	C62	その他男性性器 C60, C63
総計	8	66	6	564	19	7
新川医療圏	2	13	3	75	3	1
黒部	1	6	1	22	1	0
入善	0	3	1	12	0	0
朝日	0	0	1	6	0	0
魚津	1	4	0	35	2	1
富山医療圏	2	33	2	236	8	3
滑川	0	1	0	23	0	0
舟橋	0	0	0	0	1	0
上市	0	2	0	13	0	0
立山	0	2	0	14	2	1
富山	2	28	2	186	5	2
高岡医療圏	3	16	1	178	6	2
射水	1	3	0	44	1	0
高岡	2	13	1	97	5	2
氷見	0	0	0	37	0	0
砺波医療圏	1	4	0	75	2	1
砺波	1	3	0	27	1	1
南砺	0	0	0	29	1	0
小矢部	0	1	0	19	0	0

表 市町村別罹患数・女（H25年）

市町村	悪性	その他	乳房	子宮	子宮	子宮頸部	胎盤	子宮体部	卵巣	外陰・膣
	黒色腫 C43	皮膚 C44, C46	(上皮内含む) C50, D05	C53~55, C58	部位不明 C55	C53	C58	C54	C56~C57	その他女性性器 C51, C52
総計	11	77	804	162	5	67	0	90	83	7
新川医療圏	1	10	81	22	0	7	0	15	11	0
黒部	1	3	28	6	0	2	0	4	3	0
入善	0	3	11	3	0	1	0	2	4	0
朝日	0	0	9	3	0	0	0	3	0	0
魚津	0	4	33	10	0	4	0	6	4	0
富山医療圏	5	46	379	68	1	25	0	42	34	4
滑川	0	1	31	2	0	0	0	2	0	0
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
上市	0	2	15	1	0	1	0	0	1	0
立山	1	2	23	2	0	0	0	2	2	0
富山	4	41	310	63	1	24	0	38	31	3
高岡医療圏	5	15	244	55	4	29	0	22	26	1
射水	1	3	69	15	2	5	0	8	6	0
高岡	3	8	133	32	2	21	0	9	17	1
氷見	1	4	42	8	0	3	0	5	3	0
砺波医療圏	0	6	100	17	0	6	0	11	12	2
砺波	0	3	41	11	0	4	0	7	4	1
南砺	0	3	34	5	0	2	0	3	5	1
小矢部	0	0	25	1	0	0	0	1	3	0

表 市町村別罹患数・男（H25年）

市町村	膀胱	腎・尿管	眼・ 付属器	脳	髄膜・ その他神経系	甲状腺	副腎・ その他内分泌腺	その他 部位不明確	リンパ節 続発性	呼吸消化器 続発性
	C67	C64~C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74~C75	C76	C77	C78
総計	177	170	3	34	26	61	12	3	3	9
新川医療圏	27	21	1	3	1	9	1	0	0	0
黒部	9	7	1	2	0	3	0	0	0	0
入善	5	5	0	0	1	2	1	0	0	0
朝日	2	3	0	0	0	3	0	0	0	0
魚津	11	6	0	1	0	1	0	0	0	0
富山医療圏	82	75	1	18	16	31	8	1	3	6
滑川	5	6	0	3	1	3	0	0	0	0
舟橋	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
上市	1	3	0	1	1	3	0	1	0	2
立山	7	1	1	0	1	5	1	0	0	0
富山	69	65	0	14	13	19	7	0	3	4
高岡医療圏	50	45	0	12	7	12	3	1	0	1
射水	15	14	0	4	3	2	0	0	0	1
高岡	24	22	0	6	3	10	3	1	0	0
氷見	11	9	0	2	1	0	0	0	0	0
砺波医療圏	18	29	1	1	2	9	0	1	0	2
砺波	7	11	1	0	0	6	0	0	0	1
南砺	7	15	0	0	0	2	0	1	0	0
小矢部	4	3	0	1	2	1	0	0	0	1

表 市町村別罹患数・女（H25年）

市町村	膀胱	腎・尿管	眼・ 付属器	脳	髄膜・ その他神経系	甲状腺	副腎・ その他内分泌腺	その他 部位不明確	リンパ節 続発性	呼吸消化器 続発性
	C67	C64~C68	C69	C71	C70, C72	C73	C74~C75	C76	C77	C78
総計	55	82	0	26	41	141	16	6	2	7
新川医療圏	9	11	0	4	4	15	3	0	0	0
黒部	3	4	0	0	2	4	0	0	0	0
入善	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
朝日	2	2	0	1	0	4	2	0	0	0
魚津	1	5	0	3	2	5	1	0	0	0
富山医療圏	25	38	0	12	26	70	9	3	2	6
滑川	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0
舟橋	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	0	0	2	5	2	0	0	0
立山	2	1	0	0	4	1	1	0	0	1
富山	22	34	0	11	20	60	6	3	2	5
高岡医療圏	16	26	0	7	11	41	4	2	0	1
射水	5	7	0	5	4	6	1	0	0	0
高岡	7	18	0	2	5	26	3	1	0	0
氷見	4	1	0	0	2	9	0	1	0	1
砺波医療圏	5	7	0	3	0	15	0	1	0	0
砺波	0	3	0	1	0	10	0	0	0	0
南砺	1	3	0	1	0	2	0	0	0	0
小矢部	4	1	0	1	0	3	0	1	0	0

表 市町村別罹患数・男（H25年）

市町村	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81～C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91～C95	C91	C92
総計	5	37	213	134	5	43	31	66	13	43
新川医療圏	1	2	29	21	0	3	5	5	0	3
黒部	0	1	9	6	0	2	1	3	0	2
入善	1	0	6	5	0	0	1	1	0	0
朝日	0	0	2	2	0	0	0	1	0	1
魚津	0	1	12	8	0	1	3	0	0	0
富山医療圏	3	16	91	61	2	17	11	29	9	16
滑川	0	0	6	5	0	1	0	1	0	0
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	2	3	2	0	1	0	0	0	0
立山	0	1	12	6	0	2	4	4	1	2
富山	3	13	70	48	2	13	7	24	8	14
高岡医療圏	0	13	59	36	1	16	6	19	2	15
射水	0	3	20	13	1	4	2	4	0	3
高岡	0	9	32	18	0	10	4	12	2	9
氷見	0	1	7	5	0	2	0	3	0	3
砺波医療圏	1	6	34	16	2	7	9	13	2	9
砺波	0	4	15	6	1	3	5	3	1	2
南砺	1	2	10	6	0	1	3	8	1	6
小矢部	0	0	9	4	1	3	1	2	0	1

表 市町村別罹患数・女（H25年）

市町村	その他	原発部位	リンパ組織	リンパ肉腫	ホジキン病	リンパ様・	多発性	白血病	リンパ性	骨髄性
	続発性	不明		細網肉腫		組織球他	骨髄腫		白血病	白血病
	C79	C80	C81～C90, C96	C83, C85	C81	C82, C84, C96	C88, C90	C91～C95	C91	C92
総計	6	24	187	121	2	30	34	44	6	35
新川医療圏	0	3	14	8	0	3	3	5	2	3
黒部	0	2	4	3	0	0	1	0	0	0
入善	0	0	5	3	0	2	0	0	0	0
朝日	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
魚津	0	1	4	1	0	1	2	4	2	2
富山医療圏	3	7	94	67	0	12	15	23	1	22
滑川	0	0	5	3	0	1	1	0	0	0
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	6	6	0	0	0	1	0	1
立山	0	0	8	5	0	2	1	4	0	4
富山	3	7	75	53	0	9	13	18	1	17
高岡医療圏	2	10	58	38	2	11	7	10	0	7
射水	0	2	9	8	0	1	0	0	0	0
高岡	1	6	42	27	2	7	6	10	0	7
氷見	1	2	7	3	0	3	1	0	0	0
砺波医療圏	1	4	21	8	0	4	9	6	3	3
砺波	1	0	8	4	0	0	4	1	0	1
南砺	0	1	8	1	0	2	5	2	1	1
小矢部	0	3	5	3	0	2	0	3	2	1

表 市町村別罹患数・男（H25年）

市町村	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D07, 09
総計	0	4	6	227	7	28	104
新川医療圏	0	1	1	13	0	1	13
黒部	0	0	1	5	0	1	7
入善	0	1	0	2	0	0	1
朝日	0	0	0	3	0	0	0
魚津	0	0	0	3	0	0	5
富山医療圏	0	3	1	117	3	17	34
滑川	0	1	0	7	0	1	1
舟橋	0	0	0	1	0	0	0
上市	0	0	0	3	0	0	0
立山	0	1	0	9	0	1	0
富山	0	1	1	97	3	15	33
高岡医療圏	0	0	2	64	2	9	42
射水	0	0	1	15	0	4	6
高岡	0	0	1	37	2	5	34
氷見	0	0	0	12	0	0	2
砺波医療圏	0	0	2	33	2	1	15
砺波	0	0	0	16	0	0	4
南砺	0	0	1	12	2	0	8
小矢部	0	0	1	5	0	1	3

表 市町村別罹患数・女（H25年）

市町村	単球性	その他	形態不明	消化器	呼吸系	皮膚	子宮頸部	その他
	白血病	白血病	白血病	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌	上皮内癌
	C93	C94	C95	D00～D01	D02	D03～D04	D06	D07, 09
総計	0	1	2	145	5	30	169	24
新川医療圏	0	0	0	7	0	5	15	6
黒部	0	0	0	1	0	1	5	1
入善	0	0	0	2	0	2	3	2
朝日	0	0	0	1	0	1	0	1
魚津	0	0	0	3	0	1	7	2
富山医療圏	0	0	0	79	5	9	107	9
滑川	0	0	0	2	0	0	4	0
舟橋	0	0	0	0	0	0	0	0
上市	0	0	0	4	0	0	4	0
立山	0	0	0	5	0	3	6	0
富山	0	0	0	68	5	6	93	9
高岡医療圏	0	1	2	38	0	16	37	5
射水	0	0	0	8	0	6	13	2
高岡	0	1	2	26	0	9	18	2
氷見	0	0	0	4	0	1	6	1
砺波医療圏	0	0	0	21	0	0	10	4
砺波	0	0	0	6	0	0	3	1
南砺	0	0	0	13	0	0	5	2
小矢部	0	0	0	2	0	0	2	1