

# 輸血副作用の症状項目についての捕捉説明

発熱	輸血開始後、38℃以上に上昇した場合、輸血前から発熱している場合は <b>輸血開始後に1℃以上の上昇</b> が認められた場合
悪寒・戦りつ	寒い感じ、体の震え感
熱感・ほてり	体が熱い、またはほてった感じ
そうよう感・かゆみ	体がかゆい、またはかゆい感じ
発赤・顔面紅潮	膨隆を伴わない皮膚の赤い皮疹、顔面が赤くなった場合
発疹・じんま疹	膨隆を伴った皮疹
呼吸困難	努力性呼吸などの呼吸困難、チアノーゼ、喘鳴などの症状、SPO2の低下などがみとめられた場合
嘔気・嘔吐	
胸痛・腹痛・腰背部痛	
頭痛・頭重感	
血圧低下	輸血開始後、収縮期血圧が <b>30mmHg以上の低下</b> を認めた場合
血圧上昇	輸血開始後、収縮期血圧が <b>30mmHg以上の上昇</b> を認めた場合
動悸・頻脈	ドキドキとした感じ、成人の場合は脈拍数が100回／分以上に上昇した場合、小児に関しては対象年齢による頻脈の定義に従う
血管痛	
意識障害	意識低下、意識消失などの場合
赤褐色尿(血色素尿)	

# 輸血副作用の診断項目表

発熱					
悪寒・戦慄					
熱感・ほてり					
掻痒感・かゆみ					
発赤・顔面紅潮					
発疹・蕁麻疹					
呼吸困難					
嘔気・嘔吐					
胸痛・腹痛 ・腰背部痛					
頭痛・頭重感					
血圧低下					
血圧上昇					
動悸・頻脈					
血管痛					
意識障害					
赤褐色尿					
<b>診断名(疑い)</b>	<b>アレルギー 反応</b>	<b>細菌感染症</b>	<b>TRALI</b>	<b>輸血関連循環 過負荷 TACO</b>	<b>急性溶血性</b>
<b>発症時間の 目安</b>	<b>輸血後 4時間以内</b>	<b>輸血後 4時間以内</b>	<b>輸血後 6時間以内</b>	<b>輸血後 6時間以内</b>	<b>輸血後 24時間以内</b>