

## スギ花粉情報(4)

\*スギ花粉の本格的な飛散シーズンが始まりました。ー令和5年2月27日ー

本日(2月27日)、海沿いと森林研究所にあるスギの標準木で開花が確認されました。よって、これからスギ花粉が連続的に観測されるようになります。2月の気温が平年よりやや低く推移したため、予想(2月24日)よりも3日遅い開花となりました。また、昨年(3月4日)と比べると5日早い開花となりました。

今後、花粉の飛散数は徐々に増加していき、3月中旬に飛散のピークなると思われます。その後は、徐々に減少し、4月上旬になる頃に概ね終息するでしょう(図)。

なお、今シーズンの花粉飛散量は、平年よりやや少なくなると予想され、2,800個/cm<sup>2</sup>程度の見込みです。これから、スギ花粉の多い日にはくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が予想されますので、例年同様、マスク等による予防対策を心がけて下さい。また、目のかゆみ、鼻水、くしゃみといった症状がでた場合、花粉症の可能性が考えられますので、すみやかに医師に相談し早期治療に努めることが肝要です。




図 スギ花粉の飛散パターン

\* 今日からスギ花粉情報「あすのスギ花粉飛散」は、県森林研究所のHPにて毎日、更新します。

問い合わせ先

富山県医師会花粉症対策委員会

県森林研究所 森林資源課

主任研究員 斎藤 真己

TEL 076-483-1511

E-mail [saito@fes.pref.toyama.jp](mailto:saito@fes.pref.toyama.jp)

**【参 考】**

- ・昨年の飛散開始日 3月4日
- ・過去の飛散開始日の平均 2月25日(平成2年から令和2年までの調査)
- ・これまでで最も早い飛散開始日 2月3日(令和2年)
- ・これまでで最も遅い飛散開始日 3月9日(平成27年)