

# 「富富富」栽培特報

JA うおづ「富富富」ブランド化推進協議会




田植後の気温は平年より高く、「富富富」は順調に生育しています。今後は適期の溝掘りや中干しにより、適正な生育に誘導し、高品質で美味しい「富富富」の生産を目指しましょう！

## 1 溝掘り・中干し ~根をしっかり伸ばすとともに、過剰な分けつを抑制~

・「富富富」はコシヒカリより茎数が過剰になりやすいので、必ず田植え後3週間を目安に軽い田干しを行った後、田植後4週間(株当たり茎数16本程度)までに溝掘り・中干しを行い、本格的な梅雨の前にしっかりと干しあげましょう。

### ●溝掘りのポイント

- ・軽く田干しを行い、泥を落ち着かせてから溝を掘る。
- ・溝の間隔は5mに1本を目安とし、乾きにくい場所は重点的に実施する。
- ・ほ場の周囲と中央の1本は、特にしっかりと掘る。
- ・溝は、水尻まで確実に連結する。



【中干し終了頃のほ場の状態】

### ●中干しのポイント

- ・田面に小さなひび割れが入り長靴の跡がつく程度まで干す。
- ・表面に水がなくても足が沈むようでは不十分です。

## 2 水管理 ~適度な酸素と水分を供給し、根や稲体を健全化~


・中干し終了後～幼穂形成期までは、1日湛水・やや長めに落水(3~4日)の「間断かん水」を行いましょ。

### 間断かん水の効果

- ①適度な酸素と水分を供給し、根のさらなる伸長促進、稲体の健全化
- ②適正籾数への誘導
- ※「富富富」は葉色が濃く、茎数が過剰になりやすいため、間断かん水は、コシヒカリより落水期間を長めにし、幼穂形成期の葉色を4.0程度に誘導しましょう。

・また、幼穂形成期以降は、水分不足にならないよう飽水管理を行いましょ。

### 《水管理のイメージ》



栽培基準を守って、高品質で美味しい「富富富」の生産を！

## 3 「エスアイ加里らくだ」の施用 ~「カリ」と「ケイ酸」成分の補給~

- ・県内の水田土壌では、「カリ」と「ケイ酸」成分が大幅に不足しています。
- ・施用により稲の受光体勢の改善、下葉の枯れ上がり防止等の効果が期待できますので、「富富富」でも積極的に施用しましょ。

施用時期：6月20~25日頃  
 施用量：15kg/10a

## 4 後期除草剤の散布 ~化学合成農薬の成分使用回数12以内を厳守~

- ・一発除草剤の使用後もヒエや広葉雑草が残ったほ場は、後期除草剤を散布しましょ。
- ・ただし、今後の本田防除も含めて、化学合成農薬の成分使用回数が12以内となるように、注意してください。

※本田の病害虫防除では、今後4成分を使用する予定です。その他、農薬成分使用回数について不明な点がある場合は、事前に営農指導員へご相談ください。

対象雑草	農薬名	成分数	散布時期	散布量(10a当り)
ヒエ	トドメ MF1キロ粒剤 (5cm程度の湛水状態で散布する)	1	田植後14日~ノビエ5葉期 (収穫50日前まで)	1kg
広葉雑草	バサグラン粒剤 (落水してから散布する)	1	田植後15~55日 (収穫60日前まで)	3~4kg

## 5 区分管理上の留意点 ~「富富富」と他品種をしっかりと区分して、混入防止~

- ・異品種混入を防止するため、浮き苗を取り除くとともに、前作が水稻のほ場では、条間や株間に生える、前年の漏生籾由来の稲株を確実に抜き取りましょ。
- ・作付ほ場に、「富富富」栽培ほ場看板を設置しましょ。



【漏生籾は確実に抜き取る】

### 《「富富富」ほ場看板の記載例》

